

Colonscopia

NOTA AMMINISTRATIVA: In caso di esame istologico su biopsia, l'importo verrà incrementato di Euro 60.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA

PER UN ESAME ACCURATO E' ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE LA PULIZIA INTESTINALE.

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

DIETA

- 4/5 giorni prima adottare una dieta senza scorie (evitare verdura e frutta, assolutamente non mangiare kiwi, uva ed in genere tutta la frutta che contiene semi)

- non mangiare cibi solidi nelle due ore che precedono l'assunzione della sostanza lassativa e fino all' esecuzione della colonscopia (si può bere tea, acqua, camomilla, brodo non di verdura senza pasta, fino a 3 ore prima dell' esame).

PREPARAZIONE PER LA PULIZIA INTESTINALE

La scelta delle modalità di preparazione deve essere fatta in base alla prescrizione del medico e dell'orario di esecuzione dell'esame. Le preparazioni consigliate a base di POLIETILENGLICOLE (PEG) si distinguono in 2 tipi AD ALTO VOLUME e a BASSO VOLUME

PREPARAZIONE AD ALTO VOLUME (PREFERIBILE) : SCIOGLIERE 4 buste di SELG ESSE 1000 in 4 litri di acqua

Se la colonscopia è fissata al mattino (8-13):

il pomeriggio precedente l'esame tra le ore 16 e le ore 19 assumere 3 buste del preparato sciolte in 3 litri di acqua (1 litro ogni ora). Il mattino dell'esame dalle ore 6 alle ore 7 assumere 1 busta di preparato sciolta in 1 litro di acqua.

Se la colonscopia è fissata al pomeriggio (dopo le 13):

il pomeriggio precedente l'esame tra le ore 17 e le ore 19 assumere 2 buste del preparato sciolte in 2 litri di acqua (1 litro ogni ora). Il mattino dell'esame dalle ore 9 alle ore 11 assumere altre 2 buste di preparato sciolte in 2 litri di acqua.

PREPARAZIONE A BASSO VOLUME : MOVIPREP (MACROGOL + AC ASCORBICO BUSTA A + BUSTA B)

Se la colonscopia è fissata al mattino (8-13):

il pomeriggio precedente l'esame tra le ore 17 e le ore 18 assumere 1 bustina A + 1 bustina B del preparato disolte in 1 litro di acqua e a seguire assumere un litro di acqua o altro liquido (the, camomilla). Alle ore 22 assumere due compresse di Dulcolax. Il mattino dell'esame dalle ore 6 alle ore 7 assumere 1 bustina A + 1 bustina B discolte in 1 litro di acqua e a seguire 1 litro di acqua o altra bevanda (the, camomilla).

Se la colonscopia è fissata al pomeriggio (dopo le 13):

Il mattino dell'esame dalle ore 7 alle ore 9 assumere 2 bustine A + 2 bustine B del preparato disciolte in 2 litri di acqua e dalle ore 9.30 alle 10.30 assumere un altro litro di acqua.

DURANTE L'ASSUNZIONE DEL PRODOTTO NON E' CONCESSO MANGIARE.

IMPORTANTE: *in caso di vomito o di intolleranza al preparato sospendere l'assunzione e consultare il Medico curante od il Centro di Endoscopia. Se in occasione di precedenti endoscopie, nonostante una preparazione ben eseguita, la pulizia intestinale fosse risultata insufficiente, può essere indicato assumere un lassativo il giorno prima di iniziare la preparazione.*

COSA E' NECESSARIO FARE PER ESEGUIRE L'ESAME IN SICUREZZA?

Se il paziente è in **TERAPIA ANTIAGGREGANTE** :

- se si è in terapia antiaggregante singola per patologia cardiovascolare sarebbe opportuno sospendere la terapia almeno 5 giorni prima dell'esame (parlarne con il medico curante).

- se si è in terapia antiaggregante doppia per patologia cardiovascolare ad alto rischio (es. Cardioaspirina + Plavix) occorre concordare con lo specialista cardiologo o con il proprio curante per l'eventuale sospensione di una o entrambi i farmaci.

Se il paziente è in **TERAPIA ANTICOAGULANTE**:

- deve sospendere la terapia rivolgendosi al proprio Medico curante od al Centro della coagulazione dove è seguito per le modalità di sospensione della terapia stessa e deve eseguire l'INR il giorno precedente l'esame.

- non sospendere l'assunzione di altri farmaci abituali.

- avvertire l'Endoscopista di eventuali **ALLERGIE** e/o eventuali **PATOLOGIE CARDIORESPIRATORIE O DI ALTRA NATURA.**

- per i pazienti con grave **PATOLOGIA VALVOLARE CARDIACA, CARDIOPATIA DILATATIVA o PORTATORI DI PROTESI VALVOLARE MECCANICA** è importante concordare con il proprio Medico curante una profilassi antibiotica.

In caso di SEDAZIONE nelle 12 ore successive è controindicato condurre veicoli ed eseguire attività che comportino prontezza di riflessi. **E' necessario quindi che il PAZIENTE VENGA ACCOMPAGNATO.** E' necessario portare la documentazione sanitaria precedente, i farmaci assunti e per i pazienti che hanno sospeso la terapia anticoagulante l'esito dell' INR eseguito il giorno precedente.

PRESENTARSI PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA SCALA A 3°PIANO